

## 物理定数

(SI 単位, 有効数字 5 桁)

真空中の光速	$c_0$	$2.997\,9 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
プランク定数	$h$	$6.626\,1 \times 10^{-34} \text{ J s}$
アボガドロ定数	$N_A$	$6.022\,1 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
気体定数	$R$	$8.314\,5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
原子質量定数	$m_u$	$\equiv 1 \times 10^{-3} / N_A$ $= 1.660\,5 \times 10^{-27} \text{ kg}$
ボルツマン定数	$k_B$	$\equiv R / N_A$ $= 1.380\,6 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ $= 0.695\,03 \text{ cm}^{-1} \text{ K}^{-1}$
円周率	$\pi$	$= 3.141\,6$
電気素量	$e$	$1.602\,2 \times 10^{-19} \text{ C}$
ファラデー定数	$F$	$\equiv N_A e$ $= 9.648\,5 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
電子の質量	$m_e$	$9.109\,4 \times 10^{-31} \text{ kg}$
磁気定数 (真空の透磁率)	$\mu_0$	$\equiv 4\pi \times 10^{-7}$ $= 12.566 \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$
電気定数 (真空の誘電率)	$\epsilon_0$	$\equiv 1 / \mu_0 c_0^2$ $= 8.854\,2 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$

## 単位の換算

$$1 \text{ \AA} \equiv 1 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$1 \text{ atm} \equiv 101\,325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ amu} \equiv m_u = 1.660\,5 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$1 \text{ cal} \equiv 4.184 \text{ J}$$